

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

ANNEE 1963

N°

THÈSE

1217

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Gilbert CHASSERANT

né le 9 avril 1932 à VANVES (Seine)

Présentée et soutenue publiquement le :

CONTRIBUTION A L'ETUDE D'UN NOUVEAU CURARIMIMETIQUE
LA DI-ALLYL-NOR-TOXIFERINE PAR DES ENREGISTREMENTS
ORIGINAUX CHEZ L'HOMME ANESTHESIE

Président : Monsieur BAUMANN, Professeur.

EDITIONS A. G. E. M. P. — 8, RUE DANTE . PARIS-V^e

LANE LIBRARY. STANFORD UNIVERSITY.

ANNEE 1963

N°

THÈSE

POUR LE

DOCTORAT EN MÉDECINE

DIPLOME D'ÉTAT

PAR

Gilbert CHASSERANT

né le 9 avril 1932 à VANVES (Seine)

Présentée et soutenue publiquement le :

CONTRIBUTION A L'ETUDE D'UN NOUVEAU CURARIMIMETIQUE
LA DI-ALLYL-NOR-TOXIFERINE PAR DES ENREGISTREMENTS
ORIGINAUX CHEZ L'HOMME ANESTHESIE

Président : Monsieur BAUMANN, Professeur.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40152008_0005

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. Alajouanine (T.), Aubin (A.), Bénard (H.), Bulliard (H.), Cadenat (F.), Chabrol (E.), Debré (R.), Fey (B.), Galliard (H.), Gastinel (P.), Halphen (E.), Hazard (R.), Heuyer (G.), Lantuejoul (P.), Laroche (G.), Lavier (G.), Lévy-Solal (E.), Lian (C.), Mathieu (P.), Mocquot (P.), Monod (R.), Moreau (R.), Moulonguet (P.), Mouquin (M.), Olivier (E.), Pasteur Valléry-Radot, Petit-Dutaillis (D.), Piédelièvre (R.), Quénu (J.), Richet (C.), Senèque (J.), Strohl (A.), Tanon (L.), Verne (J.).

DOYEN Léon BINET.
Membre de l'Institut

1^{er} ASSESSEUR Gaston CORDIER
2^e ASSESSEUR Paul CASTAIGNE

I. — PROFESSEURS

1° CHAIRES DE SCIENCES FONDAMENTALES

a) Professeurs titulaires :

MM.

Anatomie	DELMAS (A.)
Anatomie pathologique	DELARUE (J.)
Anesthésiologie	BAUMANN (J.)
Biochimie médicale	{ JAYLE (M.-F.)
	{ SCHAPIRA (G.)
Biologie appliquée à l'Education physique et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)
Biologie médicale	FAUVERT (R.)
Cancérologie médicale et sociale	BERNARD (J.)
Embryologie	TUCHMANN (H.)
Histoire de la médecine et de la chirurgie (Lariboisière)	JOANNON (P.)
Histologie	GIROUD (A.)
Hygiène et médecine préventive	BOYER (J.)
Médecine du Travail	DESOLLE (H.)
Médecine légale	DEROBERT (L.)
Microbiologie (Bactériologie et virologie)	FASQUELLE (R.)
Parasitologie	BRUMPT (L.-C.)
Pathologie chirurgicale	LAURENCE (G.)
Pathologie exotique	N...
Pathologie expérimentale et comparée	MERKLEN (F.-P.)
Pathologie médicale	N...
Pathologie respiratoire	TURIAF (J.)
Pathologie et thérapeutique générales	BOUDIN (G.)
Pharmacologie	CHEYMOL (J.)
Physiologie	{ BINET (L.)
	{ BARGETON (D.)
Physiologie et pathologie obstétricale	LEPAGE (F.)
Physique médicale	{ DOGNON (A.)
	{ DJOURNO (A.)
Radiologie médicale	DESGREZ (H.)
Technique chirurgicale et Chirurgie expérimentale	CAUCHOIX (J.)
Thérapeutique	CONTE (M.)
Thérapeutique appliquée	LAMOTTE (M.)

b) Professeurs à titre personnel :

Biochimie médicale	{ DESGREZ (P.)
	{ POLONOVSKI (J.)
Biologie médicale	BOURLIÈRE (F.)
Hygiène et médecine préventive	DEPARIS (M.)
Pharmacologie	LÉVY (Mlle J.)
Physiologie	PARROT (J.)
Physique médicale	KELLERSHOHN (L.)

2° CHAIRES DE SCIENCES CLINIQUES

a) Professeurs titulaires :

MM.

Clinique carcinologique chirurgicale (Necker)	REDON (H.)
Clinique cardiologique (Broussais)	SOULIÉ (P.)
Cliniques chirurgicales	Beaujon LORTAT-JACOB (J.-L.)
	Cochin LEGER (L.)
	Cochin ABOULKER (P.)
	Hôtel-Dieu PATEL (J.)
	Pitié CORDIER (G.)
	Saint-Antoine GOSSET (J.)
	Salpêtrière SICARD (A.)
	Tenon OLIVIER (Cl.)
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants-Malades)	FÈVRE (M.)
Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique (Cochin)	MERLE d'AUBIGNÉ (R.)
Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais)	GAUDART d'ALLAINES (F. de)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laennec)	MATHEY (J.)
Clinique endocrinologique (Pitié)	DECOURT (J.)
Clinique de Génétique médicale (Enfants-Malades)	LAMY (M.)
Clinique gynécologique (Broca)	HUGUIER (J.)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis)	DEGOS (R.)
Clinique des maladies des Enfants (Enfants-Malades)	CATHALA (J.)
Clinique des maladies infectieuses (Claude-Bernard)	MOLLARET (P.)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne)	DELAY (J.)
Clinique des maladies métaboliques (Necker)	HAMBURGER (J.)
Clinique des maladies du sang (Broussais)	MARCHAL (G.)
Clinique des maladies du système nerveux (Salpêtrière)	CASTAIGNE (P.)
Cliniques médicales	Boucicaut MILLIEZ (P.)
	Broussais LENÈGRE (J.)
	Cochin JUSTIN-BESANÇON (L.)
	Cochin BROUET (G.)
	Hôtel-Dieu BARIÉTY (M.)
	Lariboisière SÈZE (S. de)
	Pitié DREYFUS (G.)
	Saint-Antoine KOURILSKY (R.)
Clinique d'hydrologie et de climatologie (Bichat)	DEBRAY (G.)
Clinique médicale propédeutique (Broussais)	GENNES (L. de)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)	
Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)	DEROT (M.)
Clinique neurologique (Salpêtrière)	DAVID (M.)
Cliniques obstétricales	Baudelocque GARCIN (R.)
	Foch (Suresnes) LACOMME (M.)
Clinique obstétricale et gynécologique (Port-Royal)	MERGER (R.)
Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu)	VARANGOT (J.)
Clinique oto-rhino-laryngologique (Lariboisière)	RENARD (G.)
Clinique de pédiatrie et de puériculture (Saint-Vincent-de-Paul)	AUBRY (M.)
Clinique de pédiatrie sociale (Enfants-Malades)	LELONG (M.)
Clinique de pneumo-phtisiologie (Laennec)	MARIE (J.)
Clinique de neuro-psychiatrie infantile (Salpêtrière)	BERNARD (E.)
Clinique de rhumatologie médicale et sociale (Cochin)	MICHAUX (L.)
Clinique stomatologique (Pitié)	COSTE (F.)
Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugirard)	DECHAUME (M.)
Clinique thérapeutique médicale (Saint-Antoine)	ROUX (M.)
Clinique toxicologique	LEMAIRE (A.)
Clinique chirurgicale orthopédique et traumatologique	GAULTIER (M.)
Sémiologie médicale	PADOVANI (P.)
Sémiologie et clinique chirurgicales	DOMART (A.)
Clinique urologique (Necker)	POILLEUX (F.)
Hygiène et clinique de la première enfance (Trousseau)	COUVELAIRE (R.)
	TURPIN (R.)

b) Professeurs à titre personnel :

Médecine	{	BOUR (H.)
		LHERMITTE (F.)
		PEQUIGNOT (H.)

II. — PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGRÉGÉS ET MAÎTRES DE CONFÉRENCES — AGRÉGÉS

	MM.		MM.
Anatomie	CABROL (C.) COUINAUD (C.) GILLOT (C.) OLIVIER (G.) pr. s. ch. GAUTHIER-VILLARS (M ^{lle} P.) pr. s. ch.	Orthopédie	JUDET (R.) MEARY (R.) POSTEL (M.) RAMADIER (J.)
Anatomie pathologique	ABELANET (R.) GHOMETTE (G.) GOUYGOU (Ch.), m. conf. NEZELOFF (Ch.) ORCEL (L.) PAILLAS (J.)	Oto-rhino-Laryngologie	DEBAIN (J.) PIALOUX (P.)
Anesthésiologie	KERN (E.) VOURC'H (G.)	Parasitologie	GOLVAN (Y.) LAPIERRE (J.)
Bactériologie	BARBIER (P.) pr. s. ch. CHRISTOL (D.) LE MINOR (L.) TOURNIER (P.)	Pathologie chirurgicale	BARGAT (J.) BINET (J.-P.) GERBONNET (G.) CHATELIN (C.-L.) DUBOST (Ch.) DUBOST (Cl.) FAUREL (J.) FLABEAU (F.) GARBAY (M.) GARNIER (H.) (Cl. de) GAUDART-D'ALLAINES GERMAIN (A.) LATASTE (J.) LOYQUE (J.) MERCADIER (M.) NATALI (J.) PELLERIN (D.) PERROTIN (J.) ROBERT (H.) THOMERET (G.)
Biochimie médicale	BAULIEU Et. m. conf. BOURILLON (R.) CARTIER (P.) DREYFUS (J.-Cl.) GONNARD (P.) KRUH (J.) JEROME (H.)	Pathologie exotique	SCHNEIDER (J.)
Biologie appliquée à l'Éducation Physique et aux Sports	PLAS (F.)	Pathologie expérimentale	BENHAMOU (J.-P.) BERTHAUX (P.) BOIVIN (P.) CROSNIER (J.) HARTMANN (L.) LÉPER (J.) Pr. s. ch. MAURICE (J.) MIKOL (Cl.) RICHET (G.)
Carcinologie	BOIRON (M.) DENOIX (P.) MATHE (G.) SELIGMANN (M.)		AUSSANNAIRE (M.) BOUVIER (J.) BOUVRAIN (Y.) BRICAIRE (H.) BRISSAUD (H.) BROCARD (H.) BUGE (A.) CATINAT (J.) CHRÉTIEN (J.) COBLENTZ (B.) CONTANIN (F.) COURY (C.) ÉTIENNE (J.-P.) FREZAL (J.) FRITEL (D.) HENNEQUET (A.) HIMBERT (J.) HOUSSET (E.) LAROCHE (Cl.) LESOBRE (R.) LEVEQUE (B.) MACREZ (C.) MOREAU (L.) NICK (J.) ROYER (P.) TOURNEUR (R.) WOLFROMM (R.)
Dermato-Syphiligraphie	CIVATTE (J.) DUPERRAT (B.)	Pathologie médicale	LAFOURCADE (J.) LEPERCQ (G.) MANDE (R.) KOZZICHNACCI (P.) POLONOVSKI (C.) ROSSIER (A.) VIALATTE (J.)
Electro-Radiologie	LEDOUX-LEBARD (G.) BESSIS (M.) BILSKI-PASQUIER (G.) DAUSSET (J.) DUHAMEL (G.)		
Hématologie	COUJARD (R.), pr. s. ch. MAROIS (M.) RACADOT (J.)		
Histologie	BESANÇON (F.) CORNET (A.)		
Hydrologie	BOYER (J.), pr. s. ch. BLANCHER (G.) CORRE-HURST (M ^{me} L.) SAPIN-JALOUSTRE (H.)		
Hygiène	BASTIN (R.) Pr. s. ch. DUPONT (V.)		
Maladies infectieuses	FOURNIER (E.) GUENIOT (M.) HADENGUE (A.)		
Médecine légale	ALBAHARY (C.) PERTUISET (B.)		
Médecine du travail	LAPRESLE (J.)		
Neuro-chirurgie	GRANJON (A.) HERVET (E.) LE LORIER (G.) LEVY (J.) MORIN (P.) MUSSET (R.) ROBÉY (M.) SENEZE (J.) SUREAU (C.) THOYER-ROZAT (J.)		
Neurologie	BRÉGEAT (P.) DUBOIS (A.) SARAUX (H.)		
Obstétrique			
Ophtalmologie			

	MM.		MM.
Pharmacologie	{ BOISSIER (J.) LECHAT (P.) BARRES (G.) DEJOURS (P.) pr. s. ch.	Psychiatrie	PICHOT (P.)
Physiologie	{ DURAND (J.) GIRARD m. conf. HUGELIN (A.) SCHERRER (J.) CHANTEUR (J.) GOUGEROT (L.), m. conf. pr. s. ch.	Psychiatrie infantile	{ DENIKER (P.) DUCHE (D.) FLAVIGNY (H.)
Physique médicale	{ GREMY (F.) m. conf. MILHAUD (G.) PELLERIN (P.) ROUCAYROL (J.-Cl) TUBIANA (M.) m. conf.	Rhumatologie	DELBARRE (F.) pr. s. ch.
Pneumo phtisiologie	{ KREIS (B.) MEYER (A.) RENAULT (P.)	Stomatologie	{ CERNEA (P.) CHAPUT (M ^{me} A.) m. c. agr. GRELLET (M.)
		Thérapeutique	{ CHASSAGNE (P.) MARCHE (J.)
		Urologie	{ AUVERT (J.) MOULONGUET (A.) QUENU (L.)

III. — PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGRÉGÉS CHARGÉS DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE à titre permanent.

	MM.		MM.
Anatomie	DEBEYRE (J.)	Clinique ophtalmologique	{ DESVIGNES (P.) OFFRET (G.)
Clinique chirurgicale . . .	VERNE (J.-M.)	Clinique pédiatrique et pué- riculture	LAPLANE (R.)
Clinique médicale	{ PERRAULT (M.) RAMBERT (P.) THIEFFRY (S.)	Clinique psychiatrique . .	BARUK (H.)
Clinique obstétricale . . .	{ GRASSET (J.) MAYER (M.)	Clinique urologique . . .	KUSS (R.)

IV. — PROFESSEURS DÉTACHÉS DANS LES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

Bactériologie	HAUDUROY (P.) Pr. s. ch.
Pathologie chirurgicale	RUDLER (J.) Pr. s. ch.

V. — CHARGÉS DE COURS D'HYGIÈNE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Secrétaire général de la Faculté	M. LENA (J.)	{ BOLTANSKI (E.) LAUNAY (C.)
Secrétaire principal	Mlle CHAINTREUIL (G.)	
Conservateur en Chef de la Bibliothèque		
Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine	M. le Docteur HAHN (A.)	
Conservateurs	Milles DUMAITRE (P.), LE NOIR (G.), QUIÉVREUX (E.)	
Bibliothécaire	{ Mmes CONTET (J.), FORGET (F.), Mlle LAURENT (H.)	

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A mes parents

A ma femme

A tous mes amis.

A Monsieur le Professeur BAUMANN

Professeur de la Chaire d'Anesthésiologie à la
Faculté de Médecine de Paris.

Qui nous a fait le très grand honneur d'accepter la
présidence de cette thèse.

Hommages respectueux.

A Monsieur le Docteur HUGUENARD

Qui a bien voulu nous confier le sujet de cette
thèse, et qui nous a toujours aidé avec la plus
grande bienveillance dans notre travail.

Qu'il trouve ici l'expression de notre respectueuse
reconnaissance.

A Monsieur le Docteur CARA

En remerciement de l'affabilité et de la clarté
de son enseignement.

A Monsieur le Docteur DELIGNE.

Pour les bienveillants conseils qu'il m'a prodigués
et pour la grande estime que je lui porte.

A Monsieur le Docteur HUGUENARD

Qui a bien voulu nous confier le sujet de cette
thèse, et qui nous a toujours aidé avec la plus
grande bienveillance dans notre travail.

Qu'il trouve ici l'expression de notre respectueuse
reconnaissance.

A Monsieur le Docteur CARA

En remerciement de l'affabilité et de la clarté
de son enseignement.

A Monsieur le Docteur DELIGNE.

Pour les bienveillants conseils qu'il m'a prodigués
et pour la grande estime que je lui porte.

1. The first part of the paper is devoted to the

study of the properties of the function

defined on the interval $[0, 1]$ by the formula

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{[0, 2^{-n}]}(x),$$

where $\chi_{[0, 2^{-n}]}(x)$ is the characteristic function of the interval $[0, 2^{-n}]$.

It is shown that

1. The function $f(x)$ is continuous at $x=0$.

2. The function $f(x)$ is not continuous at $x=1$.

3. The function $f(x)$ is not differentiable at $x=1$.

4. The function $f(x)$ is not integrable on $[0, 1]$.

5. The function $f(x)$ is not measurable on $[0, 1]$.

6. The function $f(x)$ is not bounded on $[0, 1]$.

A mes Maîtres dans les Hôpitaux de Paris :

Monsieur le Professeur OLIVIER

Monsieur le Professeur ROUX

Monsieur le Professeur DAVID

En témoignage de ma gratitude pour l'enseignement
qu'ils m'ont prodigué et le bienveillant soutien
qu'ils m'ont toujours apporté.

1. The first part of the book is devoted to a

discussion of the various methods of

estimating the parameters of the

model, and the various methods of

estimating the parameters of the model.

The second part of the book is devoted to a

discussion of the various methods of

I - INTRODUCTION

L'étude clinique et pharmacologique des curares s'est trouvée compliquée pendant longtemps par le fait qu'il s'agissait de mélanges végétaux fort complexes, où intervenait en plus le génie créateur propre de chaque sorcier de tribu. BOEHM, le premier en 1886, proposa une classification artificielle mais simple, d'après le récipient contenant le produit à l'état brut :


- 1 - Curares en pots provenant du Haut Amazone.
- 2 - Curares en tubes provenant de la Guyane Française, dont le principal alcaloïde est la d. tubocurarine.
- 3 - Curares enalebasse provenant du Haut Amazone et de la Guyane Anglaise.

Cette dernière catégorie est constituée de corps très toxiques, extraits de plantes appartenant à la famille des Loganiacées, et utilisés comme poison de guerre ou de grande chasse. La difficulté d'obtenir du produit à l'état brut explique leur étude récente. Au cours des recherches, différents corps furent isolés dont la molécule présentait de grandes analogies avec la structure chimique de la strychnine, les plus actifs étant les corps en C 40.

KARRER individualisa un nouvel alcaloïde : la toxiférine, dont la synthèse peut-être réalisée à partir de deux molécules de strychnine.

1997-1998 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768-2769 2770-2771 2772-2773 2774-2775 2776-2777 2778-2779 2780-2781 2782-2783 2784-2785 2786-2787 2788-2789 2790-2791 2792-2793 2794-2795 2796-2797 2798-2799 2800-2801 2802-2803 2804-2805 2806-2807 2808-2809 2810-2811 2812-2813 2814-2815 2816

4



C'est une volumineuse molécule présentant deux ammoniums quaternaires dont l'éloignement serait responsable de l'action curarisante. L'étude pharmacologique a permis de préciser qu'il s'agissait d'un curare non dépolarisant qui fut classé dans les pachycurares, à côté de la d.tubocurarine, corps avec lequel il fut comparé au cours d'une série d'expérimentations.

- C'est ainsi que chez le lapin (test du head drop), la toxiférine se révéla être trente fois plus active, avec une durée d'action de près du double.

D'autre part il fut noté :

- que son action était inhibée par les anticholinestérasiques
- qu'elle présentait peu d'effets secondaires, en particulier

ganglioplégique (il faut une dose égale à 50 fois la dose paralysante pour qu'apparaisse un blocage partiel du sympathique, alors qu'avec la d. tubocurarine une déconnexion totale du système nerveux autonome est obtenue avec une dose égale à 10 fois la dose paralysante).

- que son pouvoir histaminogène était faible.

Du point de vue clinique M.T. de CORNUAUD dans sa thèse concluait que la toxiférine est un corps actif à la dose de 0,015 à 0,03 mg par kilo de poids, entraînant un bon relachement musculaire, dont le temps de récupération est compris entre 50 et 160 minutes, mais s'associant à une dépression respiratoire fréquente, précoce et souvent durable obligeant à recourir aux anticholinestérasiques, et présentant enfin un effet cumulatif très marqué. Par contre ses effets secondaires sont très discrets.

L'ensemble de ces caractères a conduit à la recherche d'un dérivé plus aisément maniable, la di-allyl-nor-toxiférine.

oOo

II - ETUDE DE LA DI-ALLYL-NOR- TOXYFERINE

Elle se présente sous forme d'une substance cristalline incolore en solution dans l'eau et dans l'alcool, instable à l'air et à la lumière, mais relativement stable tant sous forme de substance sèche qu'en solution si on la maintient à l'abri de la lumière et de l'oxygène.

a - Du point de vue pharmacologique

- Administration unique -

Le produit a été étudié chez le lapin, en comparaison avec la toxiférine, la d. tubocurarine et la succinyl choline. L'action curarisante a été précisée d'après le head drop test chez 50% des animaux (D H 50).

La marge thérapeutique a été calculée en fonction de la D H 50 et de la D L 50. Il faut préciser que la mort survient par insuffisance ventilatoire suivant l'apnée et que CAHN a pu administrer jusqu'à 750 doses toxiques de toxiférine chez le lapin sous respiration artificielle sans troubles majeurs.

Les résultats obtenus peuvent être résumés dans un tableau. Ils sont exprimés en microgrammes (μ g) par kg de poids. I. V.

[illegible][illegible]

	TOXIFERINE	DI-ALLYL-NOR- TOXIFERINE	D. TUBO- CURARINE	SUCCINYL CHOLINE
D H 50	3,7	11,75	100	150
D L 50	8	20	150	400
MARGE THERA- PEUTIQUE	2,16	1,7	1,5	2,67
DUREE ACTION MOYENNE	23 mn	7 mn 30	9 mn	4 - 5 mn

- Administration répétée -

- La recherche des effets cumulatifs sur le lapin a été faite par comparaison avec la d. tubocurarine et la toxiférine.

- Les agents curarisants ont été administrés suivant plusieurs modalités.

Premier type d'expérience

- Trois lots de lapins reçoivent au temps 0 une dose non atonisante de curarisants (11/15 de la D H 50), répartis en séries les animaux reçoivent une deuxième injection de cette même dose après des délais de 30, 60, 90, 120 et 180 minutes.

- L'effet cumulatif est net avec la toxiférine même après un délai de 180 minutes, moins net avec la di-allyl-nor-toxiférine, mais pourtant plus important qu'avec la d. tubocurarine. L'effet cumulatif se juge d'autre part sur la latence d'apparition du head drop à la 30e minute, qui est doublée avec la d. tubocurarine, identique avec la di-allyl-nor-toxiférine, et raccourcie avec la toxiférine -(comparer tableau I et tableau II au temps 0).

(voir tableau ci-après).

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

TABLEAU I

% de Heed Drop	Latence H. D. en s.	Durée H. D. en s.	% H. D.	Latence H. D.	Durée H. D.	% H. D.	Latence H. D.	Durée H. D.	% H. D.	Latence H. D.	Durée H. D.	% H. D.	Latence H. D.	Durée H. D.
10/10	93	1311	9/10	176	1031	7/10	184	1318	4/5	191	849	3/5	328	680
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- 2	- 228	- 20	- 170	- 27	- 245	- 32	- 256	- 14	- 47					
7/10	75	453	6/10	78	679	5/10	63	411	1/5	120	370	2/5	125	337
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
- 10	- 30	- 13	- 133	- 7	- 42							- 40	- 172	
6/10	262	416	1/10			1/10			0/5			0/5		
+	+	+												
- 54	- 89													

2e injection
t = 0 + 30 mn

2e injection
t = 0 + 60 mn

2e injection
t = 0 + 90 mn

2e injection
t = 0 + 120 mn


2e injection
t = 0 + 180 mn

Deuxième type d'expérience

- Trois lots de lapins reçoivent au temps 0 une dose de curare égale à la D H 50. On administre les mêmes doses 30 et 60 minutes plus tard.

TABLEAU II

EMPS	Nombre d'animaux présentation H. D.			Latence H. D. en secondes			Durée H. D. en secondes			Mortalité		
	Toxif	A. N. T.	D. tubo	Toxif.	A. N. T.	D. tubo.	Toxif.	A. N. T.	D. tubo.	Toxif	A. N. T.	D. tubo.
0	9/10	6/10	5/10	256	92	105	838	568	899	0/10	0/10	0/10
				+	+	+	+	+	+			
				- 28	- 9	- 14	- 151	- 96	- 66			
30 mn	10/10	9/10	6/10	48	52	90		801	484	9/10	3/10	1/10
				+	+	+		+	+			
				- 4	- 6	- 14		- 136	- 97			
60 mn	1/10	7/7	7/9		31	59		1654	541	1/1	2/7	1/9
					+	+		+	+			
					- 11	- 7		- 302	- 103			



- Il apparaît , d'après le tableau que l'effet cumulatif de la di-allyl-nor-toxiférine est plus important que celui de la d. tubocurarine, mais beaucoup moins marqué que celui de la toxiférine.

Troisième type d'expérience

- Si pour tenir compte de la durée de curarisation on pratique des réinjections égales au tiers de la dose atonisante injectée au temps 0, à des intervalles de temps calculés d'après la durée d'action (latence du head drop + durée du head drop) on obtient le tableau suivant, montrant le pourcentage de H.D.

TABLEAU III

	TOXIFERINE	A.N.T.	D. tubo.
t = 0 dose H.D. 1e injection	3/10	3/10	2/10
2e injection 1/2 dose H.D.	4/10 22 mn	1/10 13 mn	5/10 8 mn
3e injection 1/3 dose H.D.	4/10 44 mn	1/10 26 mn	4/10 16 mn

On constate donc un effet cumulatif seulement pour la d. tubocurarine et la toxiférine. Si l'on tient compte de la durée de curarisation, la d. tubocurarine paraît posséder une action cumulative supérieure à celle de la di-allyl-nor-toxiférine.

Les recherches faites sur la jonction myo-neurale par l'étude des variations de la réponse du muscle tibial antérieur du lapin à l'excitation électrique du nerf tibial complètent ces données. Pour des réinjections d'une dose

atonisante à des intervalles de temps de 30 minutes on observe un effet cumulatif dès la 2^e injection pour la toxiférine, alors que pour la di-allyl nor-toxiférine et la d. tubocurarine cet effet n'est net qu'à la 3^e injection. Pour des réinjections du tiers de la dose atonisante pratiquée au temps 0, et à des intervalles de 30 minutes, on n'obtient pas d'effet cumulatif avec la d. tubocurarine, celui-ci est très peu marqué avec la di-allyl nor-toxiférine, alors qu'il est net à la 2^e et 3^e injection pour la toxiférine.

On peut donc estimer que dans ces conditions expérimentales la di-allyl-nor-toxiférine occupe une position intermédiaire entre la toxiférine et la d. tubocurarine.

Effets respiratoires

L'injection intra-veineuse chez le chat anesthésié de $4 \mu\text{g/kg}$ de di-allyl nor-toxiférine provoque une diminution modérée du volume respiratoire. Chez le lapin nous avons vu que la D L 50 est de $20 \mu\text{g/kg}$ et que cette dose pouvait être considérée comme la dose apnéisante conduisant à la mort en l'absence de ventilation artificielle.

Effets cardio-vasculaires

Chez le chat anesthésié l'injection intra-veineuse de $40 \mu\text{g/kg}$ nécessite une respiration artificielle, mais même à la dose de $100 \mu\text{g/kg}$ on n'observe aucune modification de la tension artérielle ou de la fréquence du pouls.

1. The first part of the paper discusses the importance of the

second part of the paper discusses the importance of the

third part of the paper discusses the importance of the

fourth part of the paper discusses the importance of the

fifth part of the paper discusses the importance of the

sixth part of the paper discusses the importance of the

seventh part of the paper discusses the importance of the

eight part of the paper discusses the importance of the

ninth part of the paper discusses the importance of the

tenth part of the paper discusses the importance of the

eleventh part of the paper discusses the importance of the

twelfth part of the paper discusses the importance of the

thirteenth part of the paper discusses the importance of the

fourteenth part of the paper discusses the importance of the

fifteenth part of the paper discusses the importance of the

sixteenth part of the paper discusses the importance of the

seventeenth part of the paper discusses the importance of the

eighteenth part of the paper discusses the importance of the

nineteenth part of the paper discusses the importance of the

twentieth part of the paper discusses the importance of the

twenty-first part of the paper discusses the importance of the

Action antagoniste de la néostigmine .

Elle a été étudiée chez le chat anesthésié au moyen de l'excitation électrique du nerf sciatique et de l'enregistrement des contractions musculaires de la jambe.

b - Du point de vue clinique

La di-allyl-nor-toxiférine a été étudiée chez l'homme par différents auteurs au cours d'interventions chirurgicales. Cette étude a porté sur le pouvoir musculo-relaxant, et la dépression respiratoire, mais aussi sur la facilité d'intubation, les effets secondaires, cardio-vasculaires en particulier, les substances antagonistes, le pouvoir histaminogène.

1 - Effet musculo-relaxant

Dans un premier temps LUND et STOVNER ont étudié la force de préhension sur des volontaires conscients, selon la méthode décrite par UNNA et coll., en comparaison avec la d. tubocurarine. A la dose de 0,055 mg/kg de poids, la di-allyl-nor-toxiférine entraîne une diminution de 72% de la force musculaire de préhension à la 3 - 4^e minute, alors qu'avec la d. tubocurarine, à la même dose, la dépression n'est que de 46% maximale, elle aussi à la 3 - 4^e minute.

La récupération à 90% survient en 15 mn pour la di-allyl nor toxiférine, en 20 mn pour le d. tubocurarine. L'injection de di-allyl nor toxiférine entraîna une atteinte des muscles de la nuque d'une durée de 2 à 4 minutes. A ces doses aucun phénomène de dépression respiratoire ne fut noté. Les auteurs estiment que la di-allyl nor toxiférine présente, en comparaison avec la d. tubocurarine un rapport d'activité de 1,5.

La consommation de di-allyl nor toxiférine a été mesurée au cours d'interventions intra-péritonéales en prenant comme critères de son efficacité la facilité à maintenir une respiration contrôlée et les remarques du chirurgien .

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637
OFFICE OF THE DEAN OF ADMISSIONS
1100 EAST 58TH STREET, SUITE 200
CHICAGO, ILLINOIS 60637

ADMISSIONS INFORMATION

The University of Chicago is a leading institution of higher learning, offering a wide range of undergraduate and graduate programs. Our faculty consists of some of the world's most distinguished scholars, and our students are among the brightest and most motivated. We are committed to providing a rigorous and challenging education, and to fostering a sense of community and intellectual curiosity among our students.

APPLYING TO CHICAGO

To apply to the University of Chicago, you must first complete the Common Application. You will also need to submit a letter of recommendation from a teacher or counselor, and a personal statement. We encourage you to apply early, as we have a limited number of spots available. Once you have been accepted, you will receive information about the next steps in the admissions process, including the deadline for submitting your application and the date of the orientation program.

FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS

The University of Chicago offers a variety of financial aid and scholarship programs to help students cover the cost of their education. These include need-based grants, merit-based scholarships, and work-study programs. We encourage all students to apply for financial aid, as we want to ensure that every student has the opportunity to attend the University of Chicago.

CONTACT US

For more information about the University of Chicago, please contact our admissions office. We are happy to answer your questions and provide you with the information you need to make a decision about whether the University of Chicago is the right place for you. You can reach us by phone, email, or through our website.

- Durant la première heure, la dose moyenne fut de 0,246 à 0,276 mg/kg . Une dose initiale de 0,250 mg/kg peut être considérée comme ayant une action relaxante suffisante et ne pas nécessiter de réinjection pour une intervention durant moins de soixante minutes.

- Durant la seconde heure, la consommation fut de 0,041 mg/kg

- Durant la troisième heure, elle fut de 0,026 mg/kg.

- En comparaison les chiffres trouvés avec la d. tubocurarine sont respectivement de 0,431 mg/kg - 0,057 mg et 0,046 mg/kg.

- Dans les deux cas la consommation durant la 2^e et 3^e heure représente le 1/6 et le 1/9 de la dose utilisée durant la 1^e heure. Ceci confirme l'effet cumulatif de ces deux corps, Il faut noter que pour des doses équivalentes de ces deux curares, il ne fut pas possible de mettre en lumière une différence significative de durée d'action.

- Si l'on compare les chiffres de consommation de di-allyl-nor-toxiférine et de d. tubocurarine aux différents temps, on constate que le rapport :

$$\frac{\text{dose de d. tubocurarine}}{\text{dose de di-allyl-nor-toxiférine}}$$

est de 1,56 à la première heure, 1,39 à la seconde, et 1,77 à la troisième heure.

- Si l'on additionne les chiffres de consommation aux différents temps, le rapport est de 1,54 à la deuxième heure, et de 1,55 à la 3^e heure.

- La constance de ce rapport, remarquable eu égard aux multiples facteurs qui interfèrent dans toute expérimentation clinique précise la puissance de la di-allyl nor-toxiférine en comparaison avec la d. tubocurarine, et confirme que l'effet cumulatif des deux corps est approximativement le même.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury on the state of the Union.

3. The third part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Health on the state of the Health.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the Labor on the state of the Labor.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the Finance on the state of the Finance.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the Justice on the state of the Justice.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the State on the state of the State.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

16.

17. The sixteenth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

18. The seventeenth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

19. The eighteenth part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

20. The nineteenth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

21. The twentieth part is a report from the Secretary of the Health on the state of the Health.

22. The twenty-first part is a report from the Secretary of the Labor on the state of the Labor.

2 - Action sur la ventilation

- Elle a été étudiée par LUND et STOVNER sur des sujets endormis.

- La mesure de la ventilation minute à la suite de l'injection

d'une dose unique de 0,200 mg/kg de di-allyl-nor-toxiférine entraîne une diminution de 75% en moyenne avec récupération à 90% à la 30-35e minute.

Ces chiffres sont confirmés par d'autres auteurs (DE CORNUAUD - DUPUY - JACQUENOUD). Par comparaison, l'injection d'une même dose de 0,200 mg/kg de d. tubocurarine entraîne une diminution de 50% en moyenne de la ventilation, avec une récupération dans un délai de temps identique. On retrouve à ce propos le rapport de puissance de 1,5 entre ces deux corps. Il faut noter que le chiffre de la ventilation-minute obtenue parfois au prix d'une polypnée superficielle, donc d'une diminution de la ventilation alvéolaire ne garantit pas une sécurité ventilatoire absolue.

- La dose apnéisante semble sujette à de grandes variations et se situe entre 0,142 et 0,275 mg/kg avec un délai de reprise compris entre 2 et 15 minutes. L'étude de la compliance thoraco-pulmonaire durant cette apnée montre que celle-ci est inférieure à celle qui suit une injection de succinyl choline.

- L'injection d'une deuxième dose de di-allyl-nor-toxiférine égale à la dose primitive apnéisante entraîne une dépression respiratoire marquée dont la durée est égale à 3,6 fois la durée de la première. Pour des réinjections comprises entre le tiers et la moitié de la dose primitive, la durée de la dépression secondaire est sensiblement égale à la dépression première.

3 - Facilité d'intubation

- A la dose de 0,200 à 0,250 mg/kg la di-allyl-nor-toxiférine a permis l'intubation dans des conditions pouvant être considérées comme très satisfaisantes. Pour obtenir les mêmes conditions, LUND et STOVNER estiment que la dose de d. tubocurarine nécessaire est de 0,350 à 0,400 mg/kg.

The first of these is the fact that the United States is a young nation.

The second is the fact that the United States is a large nation.

The third is the fact that the United States is a free nation.

The fourth is the fact that the United States is a powerful nation.

The fifth is the fact that the United States is a nation of immigrants.

The sixth is the fact that the United States is a nation of pioneers.

The seventh is the fact that the United States is a nation of farmers.

The eighth is the fact that the United States is a nation of workers.

The ninth is the fact that the United States is a nation of soldiers.

The tenth is the fact that the United States is a nation of sailors.

The eleventh is the fact that the United States is a nation of statesmen.

The twelfth is the fact that the United States is a nation of patriots.

The thirteenth is the fact that the United States is a nation of heroes.

The fourteenth is the fact that the United States is a nation of leaders.

The fifteenth is the fact that the United States is a nation of followers.

The sixteenth is the fact that the United States is a nation of citizens.

The seventeenth is the fact that the United States is a nation of voters.

The eighteenth is the fact that the United States is a nation of taxpayers.

The nineteenth is the fact that the United States is a nation of soldiers.

The twentieth is the fact that the United States is a nation of sailors.

The twenty-first is the fact that the United States is a nation of statesmen.

The twenty-second is the fact that the United States is a nation of patriots.

The twenty-third is the fact that the United States is a nation of heroes.

The twenty-fourth is the fact that the United States is a nation of leaders.

The twenty-fifth is the fact that the United States is a nation of followers.

The twenty-sixth is the fact that the United States is a nation of citizens.

The twenty-seventh is the fact that the United States is a nation of voters.

The twenty-eighth is the fact that the United States is a nation of taxpayers.

The twenty-ninth is the fact that the United States is a nation of soldiers.

The thirtieth is the fact that the United States is a nation of sailors.

- Par contre, selon VEGA, à ces doses la di-allyl-nor-toxiférine s'est montré inférieure à la succinyl-choline.

4 - Les effets secondaires

- Au point de vue cardio-vasculaire les constatations cliniques rejoignent les données expérimentales. La di-allyl nor toxiférine s'est montrée sans action sur la tension artérielle. Dans deux cas sur dix LUND et STOVNER notent une accélération passagère de dix à vingt par minute de la fréquence cardiaque, à la suite de la 1^e injection. Aucune modification de l'E.C.G. n'a été observée par ces auteurs. Il semble donc que la di-allyl-nor-toxiférine soit dépourvue d'effets secondaires sur le système cardio-vasculaire, et qu'aux doses cliniques l'effet ganglioplégique soit nul. HUGIN et KISSLING ces conditions ont pu préconiser son association avec l'halothane.

- Du point de vue de la diurèse aucune modification n'a été notée.

- Enfin, les différents auteurs s'accordent pour décrire l'absence de laryngospasme, de bronchospasme, de salivation gênante ainsi que d'irritation veineuse, sur le trajet de l'injection.

L'absence d'effets secondaires chez le chien curarisé pendant 24 h. sous ventilation artificielle est particulièrement intéressante et permet d'envisager son emploi clinique dans le traitement des tétanos gravissimes.

5 - L'effet histaminogène

- L'injection intra-dermique de di-allyl-nor-toxiférine a entraîné inconstamment une légère rougeur, alors que l'injection de d. tubocurarine est suivie d'une papule érythémateuse.

6 - Les substances antagonistes

- L'usage d'anticholinestérasiques a été recommandé en cas de curarisation résiduelle, après l'injection de multiples doses de di-allyl-nor-

toxiférine, La néostigmine - associée ou non à l'atropine - donne une réponse rapide et marquée à la dose totale de 0,5 à 1,5 mg. Aucun cas de récurarisation secondaire n'a été décrit.

On peut donc conclure que la di-allyl-nor-toxiférine est un agent plus aisément maniable que la toxiférine, d'une durée d'action moins longue, avec des effets cumulatifs infiniment moins marqués, que son action est comparable à celle de la d. tubocurarine, et que l'absence d'effets secondaires, phénomène particulièrement intéressant doit amener à préciser son étude.

oOo

III - ETUDE CLINIQUE

1 - Principe de l'expérimentation

Notre expérimentation a eu pour but d'apprécier en fonction des doses administrées, l'importance de la paralysie de la musculature respiratoire par rapport à la paralysie des autres muscles et en particulier des abdominaux ; c'est-à-dire que nous avons plus précisément visé à déterminer la dose utile, dose entraînant l'atonie des muscles abdominaux, but recherché pour que le chirurgien profite du silence abdominal, par rapport à ce que l'on peut appeler la dose inutile, c'est à dire la dose entraînant une diminution de la ventilation par paralysie respiratoire, phénomène ne présentant pas d'intérêt en chirurgie abdominale et nocif.

Nous savons qu'au cours de la curarisation, et suivant la dose injectée, un muscle donné va passer par différents stades :

- augmentation de la fatigabilité
- atonie de Bremer (suppression du tonus avec conservation des mouvements volontaires et réflexes),
- paralysie de Vulpian (paralysie avec conservation de la réponse à l'excitation électrique du nerf),
- paralysie de Claude Bernard (curarisation totale sans réponse à l'excitation électrique du nerf).

THEORY OF THE EARTH

THE EARTH'S CRUST

The crust is the outermost layer of the Earth, and is composed of solid rock. It is the layer that we live on, and it is the layer that we see. The crust is made up of different types of rocks, and it is constantly changing. The rocks are formed from molten material, and they are constantly being broken down and new rocks are being formed. The crust is also constantly being moved, and it is constantly changing shape. The crust is the layer that we live on, and it is the layer that we see. The crust is made up of different types of rocks, and it is constantly changing. The rocks are formed from molten material, and they are constantly being broken down and new rocks are being formed. The crust is also constantly being moved, and it is constantly changing shape.

The crust is the outermost layer of the Earth, and it is composed of solid rock.

The crust is made up of different types of rocks, and it is constantly changing.

The crust is the layer that we live on, and it is the layer that we see.

The crust is made up of different types of rocks, and it is constantly changing.

The crust is the layer that we live on, and it is the layer that we see.

The crust is made up of different types of rocks, and it is constantly changing.

The crust is the layer that we live on, and it is the layer that we see.

The crust is made up of different types of rocks, and it is constantly changing.

The crust is the layer that we live on, and it is the layer that we see.

L'atonie de Bremer est le stade le plus long. Cette atonie associée à une anesthésie générale est suffisante chez l'opéré le plus souvent. On estime en effet que la curarisation doit être légère.

Nous savons d'autre part, que l'atteinte des muscles se fait par ordre de chronaxie croissante. L'étude de la progression de la paralysie curarique chez l'homme montre en effet que celle-ci débute au niveau de la musculature extrinsèque de l'oeil pour toucher en dernier le diaphragme et enfin les muscles sus et sous-hyoïdiens. Ceci explique qu'à un moment donné chez le sujet curarisé certains groupes musculaires soient en état d'hypotonie, alors que d'autres sont déjà en atonie, et d'autres déjà au stade de Vulpian ou de Claude Bernard.

Notre étude a eu pour but de déterminer la dose utile, c'est-à-dire la dose qui amène les muscles abdominaux au stade d'atonie de Bremer, ce que le chirurgien réclame, sans déterminer de troubles respiratoires majeurs, en respectant le jeu du diaphragme et des premiers intercostaux qui ne sont que faiblement touchés (et que l'on peut considérer comme étant au stade d'hypotonie où la ventilation est encore satisfaisante, ou ne nécessitant du fait de la fatigabilité accrue qu'une assistance légère et non un contrôle total).

Il est difficile d'apprécier l'atonie abdominale d'une manière objective, Il faudrait placer des jauges de contrainte à l'intérieur des muscles abdominaux et disposer d'un matériel électronique que nous n'avons pas.

Nous avons pensé à étudier la réponse des muscles de la loge antérieure de la jambe, à l'excitation électrique du nerf moteur considérant (en nous référant à l'ordre d'apparition des signes de curarisation) que si ce groupe musculaire est au stade de Claude Bernard ou à un stade intermédiaire avec la paralysie de Vulpian, les muscles abdominaux sont à l'état d'atonie de Bremer.

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular.

In the second part of the paper the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β is solved. It is shown that the system has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular. The solution is found in explicit form. It is shown that the solution is unique for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular.

In the third part of the paper the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β is solved. It is shown that the system has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular. The solution is found in explicit form. It is shown that the solution is unique for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular.

In the fourth part of the paper the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β is solved. It is shown that the system has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular.

In the fifth part of the paper the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β is solved. It is shown that the system has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular. The solution is found in explicit form. It is shown that the solution is unique for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the matrix A is nonsingular.

Nous avons enregistré, également sur le même montage les mouvements ventilatoires, objectivant ainsi par un tracé toute dépression respiratoire.

2 - Description de l'appareillage

Nous avons utilisé comme appareil d'enregistrement un kymographe de Braun, dont la vitesse de déroulement uniforme du papier électro-sensible était réglée à 1 centimètre par minute, l'inscription à l'aide de stylets se faisant par étincelage. Le montage comporte deux circuits, Le premier enregistre les mouvements d'extension du gros orteil, résultante de l'excitation électrique du nerf moteur, le second enregistre les mouvements respiratoires spontanés du sujet.

Le stylet qui traduit sur le papier les mouvements du gros orteil est en rapport avec une capsule de Marey, celle-ci est en liaison par un tube avec une seconde capsule, l'ensemble constituant un système étanche, portant un levier dont l'extrémité mobile est rendue solidaire du gros orteil par un fil tendu sur un système de poulies. Il est possible de régler par l'intermédiaire d'un jeu de vis micrométriques l'amplitude des mouvements enregistrés.

Le deuxième circuit, indépendant du premier mais d'inscription simultanée comporte une capsule de Marey avec un stylet enregistreur, en rapport avec l'enceinte respiratoire et enregistrant les variations de pression à l'intérieur de ce dernier, donc l'amplitude des mouvements respiratoires et leur fréquence, qu'il est possible d'étalonner au début de l'expérience. Pour éviter toute contrainte supplémentaire aux muscles respiratoires due aux résistances du circuit anesthésique, nous utilisons un circuit semi ouvert avec large débit à 50% de protoxyde d'azote oxygène. Nous avons pensé dans un premier temps à enregistrer la poussée diaphragmatique par l'intermédiaire d'un brassard pneumatique enserrant l'épigastre, mais cette façon de procéder impliquait une résistance trop forte, augmentant la fatigue du diaphragme et par conséquent pouvant faire apparaître comme une apnée

curarique (bernardienne) ce qui ne serait qu'une atonie de Bremer ou même une fatigabilité augmentée (Ie stade) au niveau du diaphragme.

L'ensemble du montage constitue donc un système pneumatique d'enregistrement de faible inertie.

Nous avons utilisé un rhéotome électronique de Pluven et Guiot pour exciter à un rythme donné le nerf musculo cutané, branche du sciatique poplité externe, qui innerve les muscles de la loge antérieure de la jambe. Une électrode est placée sous la cuisse du sujet, l'autre est fixée sur la peau au niveau de la face externe du col du péroné, lieu de passage du nerf musculo cutané, facilement repérable. Afin d'éviter toute dépolarisation marquée due à la fatigue provoquée par des secousses musculaires à des intervalles de temps trop rapprochés, nous prenons une itération toutes les trois secondes, et d'autre part nous utilisons l'intensité liminaire que nous déterminons sur le sujet endormi avant toute curarisation.

3 - Protocole de l'expérimentation

Nous avons pratiqué nos enregistrements sur cinq sujets adultes hospitalisés pour des interventions mineures et chez lesquels on ne pouvait suspecter un épuisement métabolique.

1er sujet : âge 38 ans - poids 80 kg - hémorroïdes

- pré-médication - 1/2 phénergan dolosal

- anesthésie - pentothal dolosal

protoxyde d'azote - oxygène

2e sujet : âge 17 ans - poids 61 kg - réduction non sanglante de fracture de clavicule.

- pré-médication - 1/2 phénergan dolosal -

- anesthésie - pentothal.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

3e sujet : âge 38 ans - poids 59 kg - appendicite -

- pré-médication - I/2 phénergan dolosal -

- anesthésie - pentothal dolosal -

- protoxyde d'azote - oxygène

4e sujet : âge 25 ans - poids 65 kg - hémorroïdes -

- pré-médication - I/2 phénergan - dolosal

- anesthésie - pentothal dolosal

- protoxyde d'azote - oxygène -

5e sujet : âge 67 ans - poids 82 kg - hernie inguino-scrotale

- pré-médication - 1/2 phénergan dolosal

- anesthésie - pentothal dolosal

- protoxyde d'azote - fluothane - oxygène.

Le temps chirurgical n'a jamais dépassé trente minutes. Nous avons procédé à nos enregistrements après la fin de l'intervention. Nous avons exigé, avant de procéder, que la respiration spontanée du sujet soit correcte et stable en fréquence et en amplitude. Nous avons vérifié cliniquement l'absence d'hypoxie ou d'hypercapnie. Après l'injection de di-allyl-nor toxiférine, nous avons laissé la respiration revenir spontanément à la normale - à l'exception du 5e sujet où nous avons assisté la ventilation pendant une dizaine de minutes - sous une surveillance clinique attentive. Dans tous les cas le réveil spontané a été rapide dès la sortie de la salle d'opération. Nous n'avons observé aucune complication secondaire.

4 - Résultats de l'expérimentation

Nous avons étudié l'action du produit à la suite d'une injection unique et d'injections multiples. Nous avons enregistré également sur nos tracés l'action antagoniste de la néostigmine.

↑

60sec

↑ 4mg

- Par A. Deuxieme Experience - Par C. trace n°1 -

↑


↑

60SEC

↑
6mg


↑
Pentagimor
1mg

- Pat. A Quatrième expérience



Pat. A Première Expérience 2^e Trace -

Pat. B Première



- Пох.

Рох В. Духи́е ехрвгаса


Рох С. Гваси а 02.



60M

70M

80M



L
6

↑ 3mg

↑
PROSTIGMINE 1mg-

, 5'

A - Recherche de la dose utile à la suite d'une seule injection

1 - Premières expériences

a - Etudes du tracé n° 1

- Nous injectons à ce sujet de 80 kg une dose de di-allyl nor toxiférine de 0,05 mg/kg , soit 4 mg au total.

- Au niveau des muscles de la loge antéro- externe de la jambe.

l'effet du curare apparaît vers la deuxième minute. On note une diminution de l'amplitude de 30 - 35 % à la 3e - 4e minute qui persiste jusqu'à la 7-8e minute, puis l'amplitude des contractions croît progressivement pour atteindre 90 à 100 % à la 22e minute.

- L'enregistrement ventilatoire objective une action de curare plus précoce - entre la 1e et la 2e minute. La réduction de l'amplitude est faible - de l'ordre de 25% - et courte, mesurable seulement sur une douzaine de mouvements respiratoires. A la 4e minute, la courbe est stable au niveau antérieur à l'injection.

b - Etude du tracé n° 2

La dose , toujours égale à 0,05 mg/kg de poids, représente chez cet opéré de 65 kg une dose totale de 3,5 mg.

- L'enregistrement de la courbe de contraction des muscles de la loge antéro-externe de la jambe ne montre pas de diminution de l'amplitude .

- Paradoxalement, on note une dépression passagère de l'amplitude des mouvements respiratoires apparaissent tôt - à la fin de la 1e minute.- atteignant près de 50% sur quelques mouvements, mais d'une durée brève puisque à la 7e minute on assiste à une hyperpnée à plus de 120 %

c - Commentaire

On peut estimer - malgré la discordance entre les tracés n° 1 et n° 2 due à l'imperfection des moyens d'enregistrements actuels, point sur lequel nous reviendrons dans la discussion - que la di-allyl-nor toxiférine à la dose de 0,05 mg/kg présente un effet curarisant modéré et que son action sur la ventilation est faible et inconstante.

2 - Deuxième expérience

a - Etude du tracé

- Le sujet pesant 61 kg reçoit une dose totale de 6 mg ce qui représente 0,100 mg de di-allyl-nor-toxiférine par kg.

- Au niveau des muscles de la loge antéro-externe de la jambe l'effet curarisant apparaît après un temps de latence, à la fin de la 2^e minute, la diminution de l'amplitude est de 40% - et persiste encore à ce niveau à la 9^e minute - temps auquel on décide de pratiquer une injection de 1 mg de néostigmine.

- L'enregistrement ventilatoire ne montre pas de modification .

b - Commentaire

- A la dose de 0,100 mg par kg la di-allyl-nor-toxiférine possède une action nette sur les muscles striés de la jambe, mais n'entraîne pas de dépression respiratoire marquée.

3 - Troisième expérience

a - Etude du tracé

Nous injectons à cet homme de 82 kg une dose totale de 12 mg ce qui représente 0,150 mg/kg de poids.

Journal of the American Medical Association

Published weekly, except on Sundays, and on the first day of the month of January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. The subscription price is \$5.00 per annum in advance. Single copies are sold at 15 cents each. The subscription price for libraries and institutions is \$10.00 per annum in advance. The subscription price for foreign countries is \$12.00 per annum in advance. The subscription price for the foreign edition is \$15.00 per annum in advance. The subscription price for the foreign edition is \$15.00 per annum in advance.

Published by the American Medical Association

535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Entered as second-class matter, June 26, 1902, under post office number 384, at Chicago, Ill., under special agreement of post office and postmaster.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1918.

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.

Subscription orders, notices of change of address, and all correspondence should be sent to the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610. The subscription price is \$5.00 per annum in advance. The subscription price for libraries and institutions is \$10.00 per annum in advance. The subscription price for foreign countries is \$12.00 per annum in advance. The subscription price for the foreign edition is \$15.00 per annum in advance. The subscription price for the foreign edition is \$15.00 per annum in advance.

Copyright, 1918, by American Medical Association. All rights reserved.

Printed by the American Medical Association

Chicago, Ill., U.S.A.

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. 60610. The subscription price is \$5.00 per annum in advance. The subscription price for libraries and institutions is \$10.00 per annum in advance. The subscription price for foreign countries is \$12.00 per annum in advance. The subscription price for the foreign edition is \$15.00 per annum in advance. The subscription price for the foreign edition is \$15.00 per annum in advance.

Published by the American Medical Association

535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Copyright, 1918, by American Medical Association. All rights reserved.

Printed by the American Medical Association, Chicago, Ill.

- L'enregistrement de la courbe de contraction des muscles de la jambe objective une diminution de l'amplitude qui apparaît au cours de la 2^e minute. Cette diminution est maximale à la 5^e minute atteignant 90 à 95% de la valeur initiale, elle persiste à ce niveau jusqu'à la 14^e minute - moment où s'amorce une inflexion croissante du tracé, à la 30^e minute l'amplitude atteint 50% et parvient aux alentours de 95-100% à la 50^e minute.

- L'effet est très rapide sur les muscles de la respiration. En quelques secondes la ventilation tombe à 25% de sa valeur de départ, à la fin de la 2^e minute c'est le silence respiratoire complet. A la 11^e minute on note une faible reprise - inefficace, à la 13^e minute la reprise est meilleure atteignant 35% - à la 17^e minute elle est à 50%. La récupération est complète à 100% à la 2^e minute.

b - Commentaire

A la dose de 0,150 mg par kg, la di-allyl-nor-toxiférine entraîne une diminution de 50% de l'amplitude de contraction des muscles de la loge antéro-externe de la jambe pendant 30 minutes. A cette dose ce curare est responsable d'une dépression respiratoire marquée mais moins étalée dans le temps, puisqu'à la 26^e minute la valeur de la ventilation a retrouvé son chiffre initial .

4 - Quatrième expérience

a - Etude du tracé

La dose égale à 0,200 mg/kg représente chez ce sujet de 59 kg une dose totale de 12 mg.

- Au niveau des muscles de la loge antéro-externe de la jambe, après un temps de latence d'une minute environ, on note la survenue d'une paralysie de Claude Bernard, celle-ci va durer près de 25 minutes. A partir de cet instant se manifeste une reprise des contractions, dont l'amplitude croît très lentement, puisqu'à la 55^e minute, temps auquel on décide d'arrêter

l'expérience, elle est égale à 70% de la valeur initiale.

- Au niveau des muscles respiratoires, l'effet de la di-allyl-nor toxiférine se fait sentir rapidement. A la fin de la 1e minute la dépression respiratoire atteint 80%. A la 8e minute on assiste à une nette reprise des mouvements respiratoires. A la 11e minute l'amplitude est à 50% et à la 24e minute elle retrouve son niveau de départ.

b - Commentaire

A la dose de 0,200 mg/kg, la di-allyl-nor-toxiférine si elle entraîne une paralysie des muscles striés de la jambe pendant 25 mn, et si la diminution de 50% de l'amplitude persiste jusqu'à la 45e minute, provoque une dépression ventilatoire d'une durée plus courte jusqu'à la 24e minute la respiration a retrouvé son amplitude normale.

B - Recherche de l'effet cumulatif

1 - Première expérience

a - Etude du tracé

- Il s'agit d'un opéré pesant 65 kg, ayant reçu une première injection de 0,05 mg/kg - ce qui représente une dose totale de 3,5 mg (première expérience - paragraphe A - Tracé n° 2). Si on ne note aucun effet sur la contraction des muscles de la loge antéro-externe de la jambe, par contre on observe une légère dépression respiratoire passagère suivie à la 7e minute d'une hyperpnée.

- A la 11e minute on pratique une deuxième injection de 3,5 mg de produit égale à la première.

- L'enregistrement de la contraction des muscles striés de la jambe montre une faible mais indiscutable diminution .

- L'enregistrement ventilatoire objective une dépression peu intense (diminution de 30% de l'amplitude) et courte puisque 7 minutes après cette seconde administration nous retrouvons des valeurs voisines de 90%.

- Les courbes étant stabilisées à des niveaux à peu près égaux à ceux du départ, 11 minutes après la 2^e injection, c'est-à-dire 22 minutes après le début de l'enregistrement, on administre au sujet une 3^e dose de 3,5 mg de produit.

- Au niveau des muscles de la loge antéro-externe de la jambe, on constate une diminution de près de 75% de la force de contraction à la 4^e minute après l'injection. A la 15^e minute l'amplitude n'est encore qu'à 50% - elle atteint 100% vers la 30^e minute - soit à la 52^e minute après le début de l'enregistrement.

- Au niveau des muscles respiratoires, la dépression atteint 50% dans la minute qui suit l'injection ; la récupération est cependant assez rapide puisqu'à la 15^e minute l'efficacité atteint 90 à 100%.

b - Commentaire

L'administration à des intervalles de temps réguliers (égaux à 11 minutes) de di-allyl-nor-toxiférine à la dose de 0,05 mg/kg et par injection entraîne un effet cumulatif net surtout à la 3^e injection dont l'amplitude suggère que la drogue est métabolisée lentement.

2 - Deuxième expérience

a - Etude du tracé

Il s'agit d'un sujet pesant 82 kg, ayant reçu une première injection de 12 mg de produit ce qui représente 0,150 mg/kg (troisième expérience du paragraphe A).

L'étude de la contraction musculaire montre une diminution de la force de plus de 50% pendant 30 minutes et un retour à la normale à la 50e minute. L'enregistrement ventilatoire objective une dépression marquée allant jusqu'à l'apnée - avec un retour à une efficacité respiratoire satisfaisante à la 25e minute. La décurarisation des muscles striés de la jambe paraissant être totale à la 56e minute, nous injectons une deuxième dose égale au quart de la première, soit 0,037 mg par kg ou 3 mg de dose totale.

- On note sur l'enregistrement de la courbe de contractions musculaires à la 5e minute une diminution de près de 50% de l'amplitude persistant à ce niveau à la 17e minute. Temps auquel on décide d'administrer de la néostigmine.

- Une dépression respiratoire se manifeste au bout d'une minute environ, atteignant près de 50% pendant 7 à 8 minutes. A la 17e minute, la ventilation a retrouvé une amplitude de 80% de sa valeur initiale.

b - Commentaire

- Dans les conditions de l'expérience la di-allyl-nor-toxiférine semble posséder une action cumulative marquée puisque, l'injection chez un sujet apparemment décurarisé d'une dose entraînant sur un sujet "neuf" un minimum de signes, provoque des signes de curarisation marquée.

C - Recherche de l'effet antagoniste de la néostigmine

Il nous a semblé intéressant d'objectiver sur nos enregistrements l'action de la néostigmine qui a été décrite comme l'antagoniste de la di-allyl-nor-toxiférine.

a - Etude du tracé n° 1

- Le sujet pesant 61 kg (deuxième expérience du paragraphe A) a reçu une injection de 0,100 mg/kg de di-allyl-nor-toxiférine, ce qui représente une dose totale de 6 mg. On note une diminution de près de 40% de la force

de contraction des muscles de la loge antérieure de la jambe. L'enregistrement ventilatoire ne montre que peu de modifications. A la 9e minute, nous injectons 1 mg de néostigmine par voie intra-veineuse.

- L'enregistrement musculaire objective une augmentation de l'amplitude de contraction qui atteint 80% à la 15e minute de l'expérience. L'étude de la courbe de ventilation montre une hyperpnée à la 13e minute.

b - Etude du tracé n° 2

- Il s'agit d'un opéré de 82 kg (deuxième expérience du paragraphe 3) ayant reçu une première injection de 0,150 mg/kg de di-allyl-nor-toxiférine, soit une dose totale de 12 mg. Cette administration a entraîné des signes de curarisation profonde. A la 56e minute, la décurarisation paraissant être complète, nous injectons à ce sujet une deuxième dose de di-allyl-nor-toxiférine égale au quart de la dose initiale soit 3 mg. Au niveau des muscles de la loge antéro externe de la jambe, on observe une diminution de près de 50% de la force de contraction. Au niveau des muscles respiratoires, la dépression est plus courte puisque quinze minutes après la seconde injection l'amplitude ventilatoire se situe à 80%. A la 17e minute (soit à la 73 e minute après le début de l'expérience), le sujet reçoit 1 mg de néostigmine.

- L'enregistrement musculaire montre une action nette au bout d'une minute environ. L'amplitude de contraction atteint 100% cinq minutes après.

- L'enregistrement ventilatoire objective dans les moments qui suivent une augmentation de la ventilation.

c - Commentaire

- La néostigminè possède une action antagoniste nette vis à vis des propriétés curarisantes de la di-allyl-nor-toxiférine. Nous n'avons pas noté de récurarisation secondaire.

5 - Effets secondaires

Nous n'avons observé, au cours de nos enregistrements aucune modification du pouls ni de la pression artérielle. Nous n'avons pas constaté d'hypersalivation, de bronchospasme, ni de réaction au lieu d'injection ou sur le trajet veineux.

oOo

IV - DISCUSSION

- Notre but n'a pas été une "étude clinique", mais une "expérimentation" ayant pour objet de préciser l'importance du retentissement sur la musculature respiratoire par rapport à l'action atonisante sur les muscles abdominaux".

- Le principe de cette expérimentation postulant, d'après l'ordre d'apparition des signes de curarisation, que si les muscles de la loge antéro-externe de la jambe sont au stade de paralysie de Claude Bernard ou au stade de Vulpian - avec une diminution marquée d'au moins 50% de l'amplitude de réponse - les abdominaux sont au stade d'atonie de Bremer - suffisant pour le silence abdominal que réclame le chirurgien - peut sembler à première vue critiquable. En fait, lors que ce procédé a été utilisé au cours d'interventions abdominales, lors de précédents enregistrements, les observations des opérateurs ont confirmé les données théoriques, c'est-à-dire que la curarisation abdominale pouvait être considérée comme bonne, tant que l'ampleur de la réponse à l'excitation électrique du nerf moteur, des muscles de la loge antéro-externe de la jambe était déprimée d'au moins 50%. La difficulté de déterminer avec la plus grande précision possible l'intensité liminaire pour le temps de passage du courant choisi, nécessaire pour induire une contraction musculaire, représente la grande source d'erreurs, en ce sens qu'une intensité trop forte faussera le tracé et que l'écart séparant la paralysie de la dépression respiratoire paraîtra réduit.

V - C O N C L U S I O N S

Notre étude a eu pour but d'apprécier l'effet de la di-allyl-nor toxiférine sur les muscles ventilatoires par rapport à son action sur la musculature striée chez l'homme. Nous avons pour cela enregistré sur un même tracé la réponse des muscles de la loge antérieure de la jambe à l'excitation électrique du nerf moteur et l'amplitude de la respiration spontanée. Les constatations suivantes peuvent être tirées de l'ensemble de ces enregistrements .

- La di-allyl-nor-toxiférine agit avec un temps de latence à peu près constant : son action sur la musculature striée apparaît à la fin de la 1^e minute - l'effet maximal est obtenu à la 3^e - 4^e minute. La dépression respiratoire - lorsqu'elle se produit - est objective dans nos conditions d'expérience plus tôt - au cours de la 1^e minute. Ce temps de latence est voisin de celui de la d-tubocurarine.

- A la dose de 0,05 mg et de 0,100 mg par kg, si l'on observe une diminution de l'amplitude de contraction des muscles striés le degré de curarisation atteint n'est cependant pas suffisant pour son utilisation en chirurgie abdominale courante. La diminution de la ventilation lorsqu'elle se produit est peu intense et de durée plus courte que celle des effets "utiles".

- A la dose de 0,150 mg par kg, on note une profondeur de curarisation suffisante pendant près de 30 minutes (diminution de plus de 50% de la force de contraction musculaire) avec normalisation du tracé à la 50e minute et une dépression respiratoire persistante jusqu'à la 26e minute .

- A la dose de 0,200 mg par kg, la durée de la curarisation suffisante atteint près de 45 minutes, et l'on note une atteinte de la ventilation jusqu'à la 24e minute.

- On peut donc estimer que la dose de di-allyl-nor-toxiférine nécessaire pour obtenir un relâchement musculaire abdominal correct- et qui se situe entre 0,150 et 0,200 mg par kg de poids - entraîne une dépression respiratoire dont la profondeur peut aller jusqu'à l'apnée et dont la durée est au moins égale à la moitié du temps de la curarisation efficace.

- Il est nécessaire d'entretenir la curarisation par des injections répétées, la notion de l'existence d'une action cumulative impose la restriction dans la posologie de ces administrations secondaires, et une dose égale au quart de la dose initiale nous paraît être suffisante.

- Enfin, lorsque la lenteur de décurarisation nécessite l'emploi de substance antagoniste, l'utilisation d'un agent anticholinostérasique tel que la néostigmine paraît être valable.

En conclusion, la di-allyl-nor-toxiférine est un pachy-curare, dont la dose utile - comme cela est naturel pour un curare d'origine botanique - entraîne une dépression respiratoire marquée. La discrétion, si ce n'est l'absence de ses effets secondaires, mérite enfin d'être mentionnée.

Vu, le Président de Thèse :

Vu, le Doyen de la Faculté :

M. BAUMANN

M. G. CORDIER

Vu et permis d'imprimer
le Recteur de l'Académie de Paris

J. ROCHE

BIBLIOGRAPHIE

M. T. De CORNUAUD -

La Toxiférine - Etude clinique d'un nouveau pachy-curare
Thèse Marseille 1960 -

M. T. De CORNUAUD - B. DUPUY - P. JACQUENARD -

Action de la di-allyl-nor-toxiférine sur la ventilation - Agressologie
1963 - Tome III - n° 4 .

R. FREY - SERGER E. -

Essais cliniques et expérimentaux avec le nouvel alcaloïde toxiférine
et son dérivé le RO4-3816
Anesthésie - Analgésie - Tome 18 n° 3

GONCALVES B. et col. -

Un dérivé de la toxiférine le Ro4-3816 - relaxant musculaire
Rev. Brasil Anestésiologia II - 323 - 30 (1961)

HEROLD C. - KABACOFF J. - CAHN -

Recherche des effets cumulatifs comparés de la d. tubocurarine, de
la toxiférine et de la di-allyl-nor-toxiférine.
Agressologie 1961 - Tome II , n° 4

VON W. RUGIN UND P. KISSLING

Vorläufige Mitteilungen über ein neues kug wirkendes relaxans
von depolarisations hindernden typus das Ro4-3816.
Schweiz Med. Wschr. 91- 455 -457 (1961)

J. LISSAC - R. HERENBERG - J. VALLOIS - JJ. POCIDALO et F. LIOT -

Curarisation prolongée par la di allyl-nor-toxiférine - Etude
Expérimentale chez le chien - Comptes rendus des séances de
la Société de Biologie et de ses filiales - Tome C..L.V.A. n° 1, 1963

LUND I. - STOVNER J.

Experimental and clinical experiences with a new muscle relaxant
Ro4 - 3816 di allyl nor toxiférine.
Acta anesthesiologica Scandinavica 1962 - 6-85-97.

L. MORENA

La dialiltoxiférina ao Ro4-3816 - nella pratica anestesiológica.
Minerva anestesiológica - Vol. 29 - n° 3 (Muzzo 1963)

SEEGER R. - ARNFELDT et HAUKNSSCHILD -

Erfa krungen mit dem neuen aynthetiochem muskelrelaxans Ro4-3816
einem derivat das callebassenalkaloides toxiférine:
Der Anaesthesist 11 - 2 - 37 - 43 (fév. 1962)

VEGA D.

Consideraciones sobre la utilizacion del derivado alilico (Ro4-3816)
de la toxiférine en 250 cases.
El dia medico Uruguayo 28-3934-36 (1962)

VASER P.G. et HARBECK P.

Pharmakologie and klinische anvendung das Kursdauernden muskelre-
laxans di-allyl nor toxiferine.
Der anesthesist. 11-2 33-37 (fév. 1962).

Le protocole expérimental et le montage original utilisé pour l'étude de la di-
allyl-nor-toxiférine ont été décrits pour la première fois par HUGUENARD et
DAVID, dans Agressologie n° 1 - av. 1960. Le diiodomethylate d' α phényl-
piperideno-acetate de N-diethylamino ethoxy ethyle (L D 24 - 80) curarimimé-
tique fugace - essais- cliniques.

